



如何佩戴防液體外科口罩



佩戴口罩前後務必清潔雙手

正確的口罩

我們將在所有入口為訪問本場所的所有醫療工作者、訪客或患者提供防液體外科 (FRS) 口罩, 除非有醫療豁免, 否則**必須**佩戴口罩。

佩戴 FRS 口罩時, 務必將彩色的一面朝外, 並將金屬條置於鼻子上方。



檢查貼合度

請檢查確認口罩可以輕鬆貼合, 並完全覆蓋您的鼻子和嘴巴一直到下巴下方。

繫緊口罩掛繩, 使其緊貼您的面部, 沒有縫隙。如果有繫帶, 請將其綁高在頭頂, 以便良好貼合。佩戴口罩時**請勿**觸或擺弄口罩。



切勿

將 FRS 口罩戴在鼻子下方。



切勿

將下巴暴露在外。



切勿

鬆散地佩戴口罩, 並在側面留下縫隙。



切勿

讓口罩僅覆蓋鼻尖。



切勿

將口罩拉到下巴下方, 掛在脖子上。



請遵循以下貼士以保持安全:

在使用 FRS 口罩前後, 請務必清潔雙手。

如果您的 FRS 口罩髒了、濕了或損壞, 請務必更換。

使用可密封、乾淨的防水袋攜帶未使用的 FRS 口罩, 例如帶拉鍊的袋子。

另外攜帶一個類似的袋子, 用於盛放使用過的 FRS 口罩。

安全摘下

使用掛繩或繫帶將 FRS 口罩摘下。




請勿在摘下口罩時觸摸口罩正面。



棄置 FRS 口罩

務必將 FRS 口罩妥當地丟棄到垃圾桶中。



千萬不要忘記洗手



... 並保持社交距離。

